КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ ДЮСПАТАЛИН®

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Узбекистан: DV/X 02317/10/16, действительно до 05.11.2026.

Лекарственная форма. Капсулы пролонгированного действия.

Состав. 1 капсула содержит 200 мг мебеверина гидрохлорида.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство. **Код АТХ:** A03A A04.

Показания к применению. Взрослые и дети старше 10 лет. Симптоматическое лечение боли, спазмов, дисфункции и дискомфорта в области кишечника, связанных с синдромом раздраженного кишечника. Симптоматическое лечение спазмов органов желудочно-кишечного тракта (в т. ч. обусловленных органическими заболеваниями).

Противопоказания. Гиперчувствительность к активному веществу или к какому-либо из неактивных компонентов препарата. Беременность и период лактации. Детям до 10 лет (для данной формы).

Способ применения и дозы. Капсулы необходимо проглатывать, запивая достаточным количеством воды (не менее 100 мл). Капсулы не следует разжевывать, так как их оболочка обеспечивает длительное высвобождение препарата. *Взрослые и дети старше 10 лет.* По одной капсуле 2 раза в сутки, одна – утром и одна – вечером. Продолжительность приема препарата должна быть не менее 6-8 недель, чтобы лучше оценить эффект лечения, хотя облегчение симптомов наступает через 2-4 недели. Продолжительность приема препарата не ограничена. Специальные группы пациентов: коррекция доз для пациентов пожилого возраста, пациентов с нарушениями функции почек и/или печени не является необходимой.

Побочные действия. Сообщения о следующих нежелательных явлениях были получены в период постмаркетингового применения и носили спонтанный характер; для точной оценки частоты случаев имеющихся данных недостаточно. Аллергические реакции наблюдались преимущественно со стороны кожных покровов, но отмечались также и другие проявления аллергии. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: крапивница, ангионевротический отек, отёк лица, экзантема. Нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции).

Особые указания. Отсутствуют. *Беременность.* Данных по применению мебеверина беременными женщинами недостаточно. Не рекомендуется применять Дюспаталин® во время беременности. *Период лактации.* Неизвестно, выделяются ли мебеверин или его метаболиты в грудное молоко. Не следует принимать Дюспаталин® во время лактации. *Фертильность.* Клинические данные по влиянию препарата на фертильность у мужчин или женщин отсутствуют, однако, исследования на животных не продемонстрировали неблагоприятных эффектов препарата Дюспаталин®. *Дети.* Дюспаталин® не следует применять детям до 3-х лет в связи с отсутствием клинических данных для данной возрастной группы. Капсулы пролонгированного действия, содержащие 200 мг мебеверина гидрохлорида, не следует применять детям от 3 до 10 лет вследствие высокого содержания активного компонента. *Влияние на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами.* Исследования не проводились. Фармакологические свойства препарата, а также опыт его применения не свидетельствуют о каком-либо неблагоприятном влиянии мебеверина на способность к управлению автомобилем и другими механизмами.

Лекарственные взаимодействия. Проводились только исследования по изучению взаимодействия данного препарата с алкоголем. Исследования *in vitro* и *in vivo* на животных продемонстрировали отсутствие какого-либо взаимодействия между препаратом Дюспаталин® и этиловым спиртом.

Условия отпуска. Без рецепта.

Производитель. Майлан Лэбораториз САС, Рут де Бельвилль, Лье-ди Майар, 01400 Шатийон-сюр-Шаларон, Франция.

Полная информация о препарате находится в инструкции по применению препарата Дюспаталин® от 5.11.10.2021.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Представительство «Abbott Laboratories GmbH», в Республике Узбекистан Ташкент, 100015, ул. Ойбека, 38а или по телефонам: в Узбекистане +998781290550 (круглосуточно). Email: pv.cis@abbott.com.